

فرم آموزش به بیمار و خانواده در زمان ترخیص

شماره پرونده: Unit No:

شنت مغزی

Attending Physician: پزشک معالج:	Ward: بخش:	Name: نام:	Family Name: نام خانوادگی:
Date of Admission: تاریخ پذیرش:	Room: اتاق:	Date of Birth: تاریخ تولد:	Father Name: نام پدر:
Bed: تخت:			

آموزش های زمان ترخیص توسط پزشک و پرستار

امضاء پزشک و پرستار	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف			نام دارو	آموزش دارو
		صبح	ظهر	شب		
	قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
	قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
	قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					
	قبل از غذا <input type="checkbox"/> بعد از غذا <input type="checkbox"/> همراه غذا <input type="checkbox"/> ناشتا <input type="checkbox"/> موقع خواب <input type="checkbox"/> با آب زیاد <input type="checkbox"/>					

رژیم غذایی سالم نرم و مقوی (سوپ، پوره، گوشت و مرغ نرم، میوه و سبزی پخته)، پرهیز از غذای چرب، شور، سرخ کردنی و نفاخ، مصرف مایعات کافی

زمان کشیدن سوند (در صورت وجود): ندارد  
 زمان کشیدن درن (در صورت وجود): قبل از ترخیص کشیده می شود.  
 زمان دریافت بیوبسی (در صورت وجود): یک هفته بعد عمل  
 زمان تعویض پانسمان (در صورت وجود): روز درمیان  
 زمان کشیدن بخیه (در صورت وجود): ۲ هفته بعد عمل بعد مراجعه به پزشک  
 زمان استحمام: هنگام دوش گرفتن محل پانسمان (سر و شکم) خیس نشود.

زمان مراجعه به پزشک: دو هفته بعد عمل به پزشک مراجعه کنید.

موارد ممنوع: ضربه به سر یا محل شنت، دستکاری یا فشار دادن محل شنت بدون دستور پزشک و اجتناب از فعالیت سنگین، زوز زدن و خم شدن زیاد  
 موارد توصیه شده: استراحت نسبی و خواب کافی، مصرف منظم داروها، پیگیری منظم ویزیت های دوره ای پزشک جهت بررسی عملکرد شنت

معمولا پمپ شنت در زیر زخم سر قرار می گیرد که به شکل برجستگی قابل لمس و فشردن است که نیازی به فشردن آن برای تخلیه بهتر مایع نیست.  
 پمپ شنت خود به خود کار تخلیه را انجام می دهد و بی شتر برای معالجه پزشک و در موارد خاص برای تسریع پمپاژ در صورتی که پزشک توصیه کند.  
 در صورت تب بالا، ترشح از محل بخیه ها، تشنج، کاهش حس و حرکت در اندام ها، کاهش سطح هوشیاری، سردرد شدیدی، مداوم و تهوع یا استفراغ مکرر سریعا به پزشک مراجعه کنید. (در صورت بروز مشکل با شماره ۰۱۱۳۸۴۲۷۰ داخلی ۶۰۱ تماس بگیری.)

برای کسب اطلاعات بیشتر کد های زیر را اسکن نمایید.



فشار خون بالا



دیابت



آلژایمر



بیشگیری از زخم بستر



شنت مغزی